

XYLESTESIN™ A

キシレステシン™ A 注射液 (カートリッジ)

歯科用局所麻酔剤

メチルパラベン(防腐剤)を含有していません。
遮光性、気密性が高い缶入り包装！

アドレナリンやゴムが外気と光によって
品質変化することがより少なくなります



50本入り



劇薬 処方箋医薬品(注意—医師等の処方箋により使用すること)

包装：1.8mL×50管 (カートリッジ)

有効成分：リドカイン塩酸塩、アドレナリン

添加物：乾燥亜硫酸ナトリウム、pH調節剤、等張化剤、塩酸

「キシレステシン™ A注射液 (カートリッジ)」は、末梢神経に作用するリドカイン塩酸塩と
その作用を持続させ、かつ毒性を減弱させるために血管収縮剤アドレナリンを配合した局部麻酔剤です。

【禁忌】 (次の患者には投与しないこと)

●本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症の既往歴のある患者

効能・効果・用法・使用上の注意などについては、添付文書をご参照ください。

薬価収載

日本標準商品分類番号：87271

キシレステシン™ A 注射液 (カートリッジ)

INJ. XYLESTESIN™ -A (CARTRIDGE)

製品概要

一般名	リドカイン塩酸塩 アドレナリン
規制区分	劇薬、処方箋医薬品
有効成分	1管 (1.8mL) 中 リドカイン塩酸塩 36mg, アドレナリン 0.0225mg (2%) (1 : 80,000)
薬価	83.3 円 / 1.8mL 1管 (2024.11月現在)
製剤の性状	無色澄明の液, pH3.3~5.0
貯法	しゃ光し、凍結を避けて15°C以下に保存
有効期間	3 年

取扱い上の注意【使用回数】

本品は一回限り使用のディスポーザブル製剤であるので、再度の使用は避けること。

【薬剤投与時の注意】

使用前にカートリッジの頭部（アルミキャップ）メンブランをアルコールで軽く消毒すること。

本剤は、金属を侵す性質があるので、長時間注射針に接触させないことが望ましい。

強圧をかけずにできるだけゆっくり注射すること。

骨膜下への強圧注射は組織の損傷又はガラスチューブの破折[®]につながるおそれがある。

®注射器のプランジャーを 20kg の力で押すと構造上約 55kg/cm²の内圧がガラスチューブに加わる。
本品は使用に際して 20kg 以上の力が加わると、ガラスチューブが破損したりあるいは液もれを生じることがある。

添付文書



(01)14548188003916(10)123456

承認番号 20300AMY00340000 販売開始 1992 年 9 月

製造販売元



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/>



(ピエレル S.P.A.)